


Le CERN et le LHC



Le CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) 1952

- Devient en 1954: l'Organisation Européenne pour la recherche nucléaire: installée à Genève, pas de recherche militaire, les résultats sont publics
- Missions:
 - recherche:** questions concernant l'Univers
 - technologie:** faire reculer les limites
 - collaboration:** rassembler les nations autour de la science
 - éducation:** formation des scientifiques
- Conseil du CERN (assisté du Conseil des initiatives scientifiques et du conseil des finances) : 2 délégués et 1 voix par état, décisions à la majorité simple. Le directeur général (actuellement: R. Heuer) nommé pour 5 ans par le Conseil.



Participants au CERN

- **20 états membres** (votent au Conseil, contribuent au budget : accélérateurs, fonctionnement : 2400 personnes, ~ 1 milliard d'Euros)

l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

- **observateurs** (assistent aux réunions du Conseil)


Commission européenne, l'Inde, Israël, le Japon, la Fédération de Russie, la Turquie, l'UNESCO et les États-Unis d'Amérique

- **états non-membres** (participent aux expériences)

l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Argentine, l'Arménie, l'Australie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, le Brésil, le Canada, la Chine, Chypre, la Croatie, l'Estonie, la Géorgie, l'Inde, l'Iran, l'Irlande, l'Islande, le Maroc, le Mexique, le Pakistan, le Pérou, la Roumanie, la Serbie,

la Slovénie, la Corée du Sud, Taiwan et l'Ukraine

- les physiciens, ingénieurs, techniciens assurent la construction et l'exploitation des expériences (le CERN a une contribution minoritaire dans les expériences ~15-20%)




10 000 visiteurs

608 instituts, 113 nationalités

Grandes dates : le fil conducteur

- ▶ Découvrir des particules toujours plus lourdes
- ▶ Des interactions toujours plus subtiles (=rares !)



- ➔ Construire des accélérateurs toujours plus puissants ($E \uparrow$)
et toujours plus intenses (collisions par seconde \uparrow)
- ➔ Construire des détecteurs de plus en plus sophistiqués.
- ➔ Acquérir et analyser toujours plus de données.

Les grandes dates du CERN

1954

création du CERN

1957

1^{er} accélérateur (SC) à 0,6 GeV
fonctionne jusqu'en 1990


1959

démarrage du PS
protons à 28 GeV



le synchrocyclotron (SC)

vue du CERN en 1964



le Proton Synchrotron (PS)


Les grandes dates du CERN

1971

ISR : premier collisionneur pp au monde.

1973


Découverte des “courants neutres” : unification de l'électromagnétisme et de la force faible.



la chambre à bulles Gargamelle

photo de la réaction $\bar{\nu}_\mu e \rightarrow \bar{\nu}_\mu e$

→



Expérience Gargamelle (1973)



A. Lagarrigue (1924-1975)

Les grandes dates du CERN



1976


Le SPS: collisionneur de protons à 450 GeV, reconverti à partir de 1979 en collisionneur $p\bar{p}$

1983

Les Expériences UA1 et UA2 y découvrent les vecteurs de la force faible: W^\pm et Z^0 .

1985

Prix Nobel de physique à C. Rubbia et S. Van der Meer.



UA1




UA2

Les grandes dates du CERN


1970's

Saut technologique: G. Charpak invente la chambre à fils.




Les grandes dates du CERN

Avant: Analyse de clichés




1960 , interactions de protons du PS avec de l'hydrogène

Après: reconstruction électronique et informatique des collisions



Ère manuelle



Ère électronique
(1000 fois plus vite)

Les grandes dates du CERN

1989

Démarrage du LEP: collisionneur électron-positron, 50 GeV.
Creusement du tunnel de 27 km débuté en 1985.
4 expériences étudient pendant 7 ans les propriétés du Z^0 .
De 1996 à novembre 2000 l'énergie des faisceaux du LEP est montée à 100 GeV (étude détaillée de la force faible)



1990

La gestion des données prend un nouvel essor:

➔ Invention du Web par T. Berners-Lee




2001 : collaboration Delphi devant le détecteur

Les grandes dates du CERN

1990's

Des technologies de mieux en mieux maîtrisées pour contrôler aussi des particules de basse énergie.



L'anneau LEAR d'antiprotons à basse énergie



1995

premiers atomes (9)
d'anti-hydrogène

2002


des milliers d'atomes
d'anti-hydrogène.

Les grandes dates : Le LHC ! (2008)



CMS

Aéroport



ALICE

ATLAS




LHCb



Pourquoi le LHC ? Quelles raisons théoriques ?

Mécanisme de Higgs permettant aux particules élémentaires d'avoir une masse.




Au moins une nouvelle particule: le boson de Higgs

Certains calculs deviennent infinis à très haute énergie

- Théorie actuelle incomplète
- Nouvelles théories

Peter Higgs “devant” le mécanisme “de Higgs”

matière noire?



supersymétrie

La conception du LHC


Construit dans le tunnel de 27 km occupé avant par le LEP, ~5 Milliards d'Euros.




Conçu dans les années 80,
approuvé en 1994, sa
construction débute en 1998.

Collisionneur proton-proton de 7 TeV,
supraconducteur
(-271,3°C, **plus froid que le vide spatial**)
très intense
(600 millions de collisions par seconde)



Consommation électrique: 120 MW
(équivalente à celle d'une ville de 150 000 hab.)



Fonctionnement du LHC : la chaine d'accélération






Les différents accélérateurs du CERN sont utilisés pour accélérer et injecter les protons dans le LHC.



Il faut guider et accélérer les protons.


Guidage



Les particules suivent une orbite circulaire, mais ne gagnent pas d'énergie

Accélération

1 - Voici quelques particules au repos



Les particules gagnent 16 MeV par passage (11000 passage par seconde)

Le faisceau du LHC

Actuellement ~1400 paquets contenant chacun 100 milliards de protons.
Chaque paquet est séparé de ses voisins immédiats par au moins 7m.



Aimants focalisant les faisceaux
au voisinage des points de collision

Énergie actuelle d'une collision (2011) :

$$3.5 \text{ TeV} + 3.5 \text{ TeV} \sim 10^{-6} \text{ J}$$

sur une surface infime 10^{-30} m^2


$$\sim 10^{24} \text{ J/m}^2 : \text{considérable}$$

Énergie totale des faisceaux :

$$3.5 \text{ TeV} \times N_p \sim 350 \text{ millions de Joules} \sim 1 \text{ TGV à } 150 \text{ km/h}$$

paquets : quelques cm de long
transversalement ~ mm

taille transverse au point de collision
(expériences) : $16 \mu\text{m} \times 50 \mu\text{m}$
~ diamètre d'un cheveu



Relative beam sizes around IP1 (Atlas) in collision


Croisement des faisceaux à un point de collisions

Le LHC en chiffres

- La plus grande machine du monde (9300 aimants, 10000t d'azote, 120t d'He)
→ le plus grand frigo de la planète
- Les protons effectuent 11245 tours de la machine par seconde (vitesse $\sim 99.999993\%$ c)
- Vide très poussé à l'intérieur de la chambre à vide (10^{-13} atm)
→ 1/10 de la pression sur la lune
- On y trouve les points les plus “chauds” (100000 fois la température interne du soleil)
dans un espace minuscule et dans un anneau plus froid que le vide sidéral (-271.3°C)



ligne cryogénique avant la pose des aimants



chambre à vide du LHC (en coupe)



Les apports pour la société

Les découvertes en sciences fondamentales permettent les grandes avancées


- *Les transistors ont été inventés parce qu'on avait découvert la mécanique quantique*
- *Le système de positionnement GPS utilise la relativité générale*

La recherche a des besoins spécifiques : elle développe de nouvelles technologies

- *Le "world wide web" inventé au CERN*
- *Actuellement, plus de 7000 physiciens analysent les données du LHC. Elles occuperaient un pile de CD de 20km de hauteur chaque année. De nouveaux moyens de stockage et de calcul ont donc été mis au point :
→ la grille de calcul*
- *L'imagerie médicale utilise les technologies de détection de la physique des particules.*



Système de tomographie à émission de positons



"ferme" de PC au CERN (2006)

Grandes dates: le fil conducteur

- ▶ Construire des accélérateurs toujours plus puissants ($E \uparrow$)
et toujours plus intenses (collisions par seconde \uparrow)

1954: Synchrocyclotron

- Protons à 0.0006 TeV

- I = 0.3 mA

+ 50 ans =

2008: LHC

- Protons à 3.5 TeV

- I >100 mA

- ▶ Construire des détecteurs de plus en plus sophistiqués
- ▶ Acquérir et analyser toujours plus de données.

Les grandes dates du CERN

1971

ISR : premier collisionneur pp au monde.

1973

Découverte des “courants neutres” : unification de l'électromagnétisme et de la force faible.



la chambre à bulles Gargamelle



photo de la réaction $\bar{\nu}_\mu e \rightarrow \bar{\nu}_\mu e$



A. Lagarrigue (1924-1975)